

17. Ananaska courtraiská.

Čti: Ananaska kartryjská.

Zraje v srpnu—září.

V Belgii velice rozšířená hruška, střední velikosti, až 280 g těžká, tvaru pravidelného, hruškovitého, povrch jest vždy mírně zhrbolelý; bývá as 10 cm dlouhá, 7 cm široká.

Kalich jest otevřený, sedí na povrchu, obklopen malými hrbolky.

Stopka jest dřevnatá, často nerovná a hrboilatá, silná, do špičky plodu vtačená a někdy převyšujícím hrbolem ke straně přitlačená.

Slupka jest hladká, později masná, zelenavá, zráním zežloutne. Hnědými tečkami jest hustě pokryta, v obkaloší i kolem stopky bývá rozstříknuta jemná rez.

Dužnina jest zelenobílá, máslovitá, šťavnatá, chuti sladce navinulé, jemně kořenné, výtečné.

Jádrinec má širokou dutou osu, velké pootvřené komory s dobře vyvinutými jádry.

Češe se postupně od počátku až asi do 20. září, a nechá se v plné zralosti asi 14 dnů udržeti; protrháváním plodů a ukládáním do chladné místnosti jest možno zralost oddáliti a na stromě zbylé plody mohou se rádně vyvinouti.

Strom roste mírně, tvoří úhledné, široce jehlancovité koruny. Může se pěstovati ve všech tvarech stromů, zvláště pro zákrskové stromy do domácích zahrad možno ji doporučiti. Šlechtěna na kdouli dobře se daří; pro velké tvary jest prospěšné šlechtiti ji na pláň.

Rez používá se prostředně dlouhý a snáší jej dobře. Ploditi začíná velice záhy, úrodnost jest stálá, měnivá. Po velké úrodě vyžaduje hlubší zmlazení.

Půdy béře za vděk jakékoliv, jsou-li jen pro hrušně způsobilé, nejlepších výsledků docílí se v půdách obdělávaných, přiměřeně vlhkých a teplých.

Polohy vyžaduje chráněné.

Opylovací vlastnosti nejsou dosud vyzkoušeny.

Kvete prostředně záhy.

Špatné vlastnosti: Dřevo v krutých mrazech namrzá, v květu jest vůči mrazům choulostivá. Pro vzdálenější dopravu se nehodí.

Upotřebení: Výtečná chuť a vzhledný tvar řadí ji k nejlepším trzním hruškám.

Synonyma: Ananasová, Ananasbirne von Courtrai, Poire Ananas de Courtrai.

17. Ananaska courtraiská.

