

33. Colomaova máslovka.

Čti: Kolomaova máslovka.

Zraje v říjnu.

Belgická hruška, prostřední velikosti, nejčastěji vejčitého, na obou koncích ufatého tvaru; mnohdy také končí špičkou tak zúženou, že vypadá jako by ve stopku přecházela; velké plody bývají lehce zhrbolené. Váží až 250 g.

Kalich jest otevřený, v malé, jemně zhrbolené jamce.

Stopka jest silná, dřevnatá, bývá na špičku plodu přitlačena, nebo jest v širší, mělké, mírně zhrbolené jamce.

Slupka jest lesklá, mastná, světle žlutá, u stopky zelená; jemné rzivé tečky pokrývají hustě celý plod, místy jest stříknuta i drobná rez.

Dužnina - zdánlivě zrnitá - jest jemná, šfavnatá, znamenitě, navinule cukernatě, kořenné chuti. Ze špatné půdy bývá přitřpklá.

Jádrinec jest úzce dutoosý, komory prostranné, jádra plně vyvinutá.

Čese se ke konci druhé poloviny září, od polou října k jídlu dospívá, dá se 2—3 neděle udržeti.

Strom roste zdravě, ale mírně, tvoří širokou, kulovitou a hustou korunu, vyvinuje hojně plodonosných ratolestí. Plodnost jest podmíněna polohou; v teplých, chráněných místech plodí brzy a hojně, v drsných pozdě a málo. Šlechtěna na kdouli hodí se k pěstování v jakémkoliv zákrskovém tvaru, roste na této podnoži zdravě, vždy však slabě. Řeže se dlouzeji. Nutno dbáti, aby květné puky, které se tvoří na krátkých větvíčkách, nebyly zkracovány. Má-li plně uspokojiti vyžaduje hluboké, živné půdy, místa teplá, chráněná.

Kvete prostředně pozdě.

Jest dobrým opylovačem.

Špatné vlastnosti: V mokré a studené půdě bývá bez chuti; ve šterkovitých a krutých jilech usychají špičky letorostů, plody jsou drobné, zrnité. V nížinách trpí fusicladiem.

Upotřebení: K dopravě hodí se pouze dobře balená a nedozralá, později jemná slupka tlaku nesnese. Jest dobrou stolní a obchodní odrůdou.

Synonyma: Coloma's Herbstbutterbirne, Poire des Urbanistes, Urbaniste, Beurré Piquery, Louise d'Orlean, Saint Marc.



33. Colomaova máslovka.