

36. Hájenka.



## 36. Hájenka.

Zraje v říjnu.

Belgická hruška, nadprůměrní velikosti až veliká, dosahuje až 800 g váhy.

Tvar vejčitý, povrch vždy pěkně stejnoměrný; bývá průměrně asi 10 cm dlouhá, 8 cm široká.

Kalich jest otevřený, bývá buď v miskovité mělké jamce, neb pouze na úzkém, poněkud šikmém temeni, obklopen jemnými hrbolky.

Stopka jest dřevnatá, lehce zahnutá, v pravidelné jamce.

Slupka jest hladká, pěkně žlutá, strana sluncem ožehlá bývá žíhaně červená; hrubší tečky pokrývají hustě plod, který bývá jemnou rží pokryt a u kalichu tvoří hustý povlak. Slabě voní.

Dužnina jest bílá, zdánlivě zrnitá, velice jemná, hojně šťavnatá, chuti výtečné, sladké, aromatické.

Jádrínek jest úzce dutoosý, komory poměrně malé, jádra pěkně vyvinutá.

Češe se asi ke konci září, po očeštění brzy k jídlu dospívá, uzrává asi po 14 dnů.

Plody nesmí se nechati na stromě zežloutnouti, neb nejsou tak chutné a nutno česání podle počasí vysáhnouti.

Strom roste polobujně, pěkně do výše, vytváří zvolna korunu se slabšími větvemi, které pod tíhou plodů rozklesávají. Nejlépe sázeti stromky zákrskové v jakémkoliv tvaru. Na kdouli špatně se daří, roste, ale téměř nenarůstá a na kdouli se hodí jedině pro nejmenší tvary. Jinak vždy se šlechtí na pláň; ani na tom však příliš neroste.

Plodnost počíná záhy a jest stálá. Řez vyžaduje dlouhý, podzimním řezem se musí délka dřeva více zkracovati, aby se plodonosné dřevo příliš neprodužovalo. Daří se jen v nejlépejších, živných, teplých půdách, i ve vyšší, avšak chráněné poloze.

Jest špatným opylovačem.

Kvete prostředně záhy.

Špatné vlastnosti: Vítr plody velmi shazuje a dřevo, list i ovoce trpí fusikladiem.

Upotřebení: Pro zasilání hodí se ihned po sčesání; jest to výborná stolní hruška, velmi dobře placená.

Synonyma: Dřevobarvá máslovka, Máslovka lesní, Holzfarbige Butterbirne, Fondante des Bois, Beurré Spence, Liegel's Dechantsbirne.