

Karlůvka 61.

60. Bezjaderka Říhova.

Zraje v listopadu, vydrží do prosince.

Tvar má stejnoměrný, plody jsou kratší a bývají baňatější, mají temeno širší, vždy šikmé, v bocích jsou stlačené, k temeni lehce zhrnatělé; bývá asi 10 cm dlouhá a 7 cm široká, až 250 g těžká.

Kalich jest v malé ploché jamce, nebo na mírně zhrboleném temeni.

Stopka jest dřevnatá, do špičky plodu mezi hrbolky vtačená.

Slupka jest hladká, zelenožlutá, někdy na sluneční straně lehce zarudlá; celá jest poseta jemnými tečkami, často zvláště kolem stopky a v obkاليší hojně porezavělá.

Dužnina jest bílá, velmi jemná, chuti výborné, sladce kořenité.

Jádrinec jest zcela nepatrný, málo znatelný, komory malé, těsné, jádra chybějí.

Češe se v polovici října, předčasně otrhaná poněkud vadne; k jídlu dospívá asi v první polovici listopadu, vydrží do polovice prosince.

Nejvhodnějším tvarem jsou zákrskové stromy na kdouli šlechtěné; hojně se rozvětvuje a brzy a velmi hojně plodí, často jest nutno plodnost řezem omeziti a vzrůstu všemožně napomáhati.

Daří se v dobré, těžší, vlhké půdě a před větry chráněné poloze. Jest velmi náročná.

Jest dobrým opylovačem.

Kvete prostředně pozdě.

Špatné vlastnosti: Za krutých mrazů mladé stromky někdy zmrzají, v suché půdě plody před sklizní spadnou; místy i plodnost jest nestálá.

Upotřebení: Jest jednou z nejlepších stolních odrůd, v obchodě není dosud mnoho známa.

Synonyma: Říha's kernlose Butterbirne, Sanspépin.

*naše
varpal.
vina
plošina*

60. Bezjaderka Říhova.

