

84. Hardenpontova
máslovka.



84. Hardenpontova máslovka.

Zraje v listopadu, vydrží do února.

Belgická hruška, tvaru obyčejně uprostřed nejširšího, ke stopce i kalichu poněkud prohnutě se zužujícího. Povrch bývá vždy nestejný, zhrbolený, některé plody jsou k temeni i zhranatělé; bývá as 10 cm dlouhá a 8 cm široká, až 580 g těžká.

Kalich je otevřený, v hluboké a hrbolaté, dosti objemné jamce.

Stopka jest silná, dřevnatá, trčí z jamek, které se řídí rozměry a tvarem plodu, což se stává také u mnoha jiných odrůd. Jamka jest vždy hrbolatá.

Slupka jest silná, hladší, mdlá, zelenožlutá, částečně rzivá, málokdy slabě nahnědle zbarvená. Jest poseta velmi hustě jemnými rzivými tečkami, blíže kalicha a stopky bývá stříknuta jemná rez.

Dužnina jest bělavá, neobyčejně lahodná a jemná, v suchých půdách mávka kamenitost.

Jádrinec jest široce dutoosý, komory prostranné a dlouhé a v nich jest jen několik dobře vyvinutých jader.

Češe se v polovině října; čím později je trhaná, tím dociluje lepší chuť a déle vydrží.

Zraje od prosince do ledna, dobře uložená vydrží do konce února i déle.

Strom roste až do stáří zdravě, nebývá nikdy veliký, tvoří jehlancovitě kulovité, hojně rozvětvené, řídké listnaté koruny.

Ke zdárnému vývoji vyžaduje půdy hluboké, přiměřeně vlhké a hlavně teplé; také místo se má voliti chráněné a teplé a kde takové není, má se od výsadby upustit. Nejvhodnější jest zákrskový strom v jakémkoliv tvaru a sázeťi jej poblíž stěn atd. Na kdouli roste velmi dobře, řez vyžaduje delší. Plodnost počíná později, potom jest stálá a uspokojivá.

Jest dobrým opylovačem.

Kvete prostředně pozdě.

Špatné vlastnosti: Trpí fusicliadiem a jest s oblibou vyhledávána Smutnicí hruškovou a často se stává, že i když bohatě kvete i hojně plodů nasadí, skoro vesměs spadnou. V písčitých suchých půdách se nedaří. Jest náročná.

Upotřebení: Před úplným dozráním snáší dopravu dobře. Náleží k nejlepším stolním odrůdám.

Synonyma: Hardenpont's Winter-Butterbirne, Beurré d'Hardenpont.