

98. Esperenova bergamotka.

Zraje v únoru, vydrží do dubna.

Belgická hruška, poněkud malá, zploštěle zakulaceného tvaru, u stopky tvořící nízkou špiči; plody bývají až 300 g těžké. Často jsou v chomáčích a za příznivých poměrů nabývají až této váhy. Tvar se mění málo, povrch větších plodů bývá nepravidelný, zhrbolený a zhranatělý. Kalich jest uzavřený, obklopený hrbolky, vězí v nerovné, mělké jamce.

Stopka menších plodů bývá delší, přechází kroužkovitými hrbolky v plod, nebo u větších jest v okrouhlé, mělké, po okraji zhrbolené jamce a bývá ke špičce plodů jako přimáčknutá.

Poměrně drsná slupka jest po uzrání zažloutlá, na sluneční straně poněkud nahnědle zbarvená. Hrubé, šedohnědé, nápadné tečky pokrývají hustě celý plod, místy objevuje se i hrubší drobná rez. Obkališí bývá souvisle rezovitě.

Dužnina plodu za nejpříznivějších podmínek bývá jemná, hojně šfavnatá, pikantní, sladce navinulé, kořeněné chuti.

Jádrinec má širokou, dutou osu, komory prostranné, jádra dlouhá, nestejně vyvinutá.

Češe se koncem října, brzo otrhaná vadne. K jídlu dospívá velice nestejně, nejdříve měknou velké plody, od února až do dubna.

Strom roste až do pozdního stáří bujně. Hodí se jedině pro zákrskové stromy všech tvarů. Na kdouli roste bezvadně, vytváří velmi mnoho plodonosných ratolestí; plodnost počíná velmi brzo, je stálá a hojná, často musí se ovoce pro lepší vývin protrhati.

Daří se ve výživné, dostatečně vlhké, výhřevné půdě, v chráněné, teplé poloze. Hodí se dobře na jižní stranu stěn. Řez provádí se střídavý, květné puky tvoří se také na koncích.

Jest dobrým opylovačem.

Kvete prostředně pozdě.

Špatné vlastnosti: Z nevhodných, studených míst plody vůbec neměknou, nebo praskají a nejsou k potřebě, také i fusicladium se objevuje.

Upotřebení: Dopravu snáší bezvadně, za pěkné plody v obchodech dociluje se vysokých cen.

Synonyma: Espérens Bergamotte, Bergamotte Esperen.



98.

Esperenova bergamotka.