

**DĚKANKA LETNÍ****Synonyma:** Bergamotka letní.**Výskyt:** Bzová.**Tvar:** široce tupě kuželovitý až kulovitý, ke stopce více ke kalichu méně zúžený. Stopečná část mírně skosená. Plod je nejširší uprostřed.**Velikost:** malá až střední, výška plodu je asi 60 mm, šířka 58–60 mm. Hmotnost kolem 120 gramů.**Stopka:** krátká, středně silná, délka asi 10 mm, je žlutozelené barvy s podélným světle červenohnědým pruhem. Sedí šikmo v malé, mělké, mírně hrbolaté stopečné jamce, někdy s jedním větším a širším hrbolem.**Kalich:** velký, otevřený v mírně rzivé široké a mělké jamce. Ušty jsou tenké, šedé, položené nebo olámané a od sebe vzdálené. Obkalíší je ploché, široké, mírně zvlněné.**Slupka:** je pevná, středně silná, lámavá, hladká. Základní barva je zelenožlutá, plod je ze třetiny překryt jasně oranžově červeným líčkem. Výjimečně se na plodu vyskytuje jemná rzivost. Lenticely v základní barvě jsou zelené nebo hnědozelené, v líčku intenzivněji oranžové.**Dužnina:** bílá, středně tuhá, zrnitá, šťavnatá až v plné zralosti. V okolí velkého jádřince jsou větší sklereidy. Chuť je navinulá, kořenitá, dobrá. Brzy moučnatí, hniličí až v úplné zralosti.**Zralost:** koncem července a začátkem srpna. Skladovat se nedá.**Poznámka:** Plody je lépe podtrhnout a konzumovat ve sklizňové zralosti. K průmyslovému a kuchyňskému zpracování je méně vhodná. Tato odrůda byla známá již v 17. století, na přelomu 19. a 20. století se zaměňovala s odrůdou 'Děkanka červencová' (má menší plody, které zrají v polovině července). V zahraničí se nejvíce rozšiřovala v 18. a 19. století pod mnoha názvy. V českých pomologických není popsána.