



12. Chlumecká raná srdcovka.

## 12. Chlumecká raná srdcovka.

**Původ:** V okolí města Chlumce n. Cidl. jest odedávna tato krajová odrůda pěstována.

**Srdcovka** prostřední velikosti. bývá širší než vyšší, u stopky jest široká a téměř má ploše zaokrouhlené. Jedna strana jest lehce proláklá, po druhé táhne se čára, která dělí plod na dvě nestejně části. 10 plodů váží 50—52 g.

**Stopka** jest tenká, světle zelená, 45—50 mm dlouhá, v široké, hluboké, po okraji nerovné jamce.

**Slupka** u plodu úplně nedozralého jest jasně červená, hustě bledými, prosvítajícími pihami posetá, v plně zralosti stává se barva tmavší, jest hnědě šarlatová a pihy se tratí.

**Dužnina** úplně zralých plodů jest tmavě rudá, bělavě prokvétalá, hustá, plná barvivé šťávy, chuti dobré, navinule sladké.

**Pecka** jest malá, zašpičatělá.

**Zraje** v I. až II. týdnu třešňovém, asi 15.—18. června; aby se lépe zpeněžila češe se za června, asi 8.—10. června.

**Strom** tvoří vysokou a širokou korunu, větve se sklánějí a vyznačuje se brzkou, hojnou a stálou plodností. Daří se téměř všude, prospívá v každé propustné půdě. Štěrka a písek jí nesvědčí, zakrňuje a plody jsou drobné. V čas květu nejméně zmrzá.

**Špatné vlastnosti:** V deštích puká.

**Upotřebení:** Dopravu snáší ve stavu červeném dobře, pro svoji ranost jest dobře placena a proto výnosná.

**Synonyma:** Hátiwe de Chlumec, Frühe aus Chlumec, Chlumecka wczesna.

Dobré vlastnosti lze oceniti i u srdcovky

### Chlumecké černé;

jest to také lokální odrůda téhož kraje, zraje mezi poloranými třešněmi.