

85. Schneiderova pozdní chrupka.

Původ německý (Guben).

Plod jest velmi veliký, asi 26 mm vysoký a 30 mm široký; 10 kusů váží 80—90 g.

Tvar má široce srdčitý, povrch částečně a ne-
stejně zhranatělý. Jedna strana jest vypouklá,
k temeni více stlačená, táhne se po ní hlubší,
tmavší rýha; druhá strana jest naopak zploštělá
a po této se táhne čára, často vyznačená pouze
barvou. Temeno bývá k jedné straně skosené,
zaokrouhlené, u menších plodů i zašpičatělé,
tmavá tečka jest buď úplně na povrchu, nebo
v malé prohlubince. Průřez plodů jest zhrana-
tělý.

Stopka asi $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ cm dlouhá, prostředně
silná, jest zelená, u plodu částečně zarudlá, sedí
v široké a hluboké jamce.

Slupka jest pevná, tmavočervená, v úplné
zralosti hnědá, světle až tmavě pruhovaná a
zvláště v zastíněných místech jemně a znatelně
tečkovaná a čárkovaná.

Dužnina jest velmi tuhá, ne však tvrdá, řídice
vláknitá a šfavnatá, šťáva nebarví; barvu má
žlutou, kolem pecky jest začervenalá, chuti
znamenité, sladké, příjemné, lehce navinulé.

Pecka jest prostředně veliká, dlouze oválná,
od dužniny úplně nepouští.

Zraje ve IV.—V. týdnů třešňové zralosti.

Strom roste velmi bujně, dosti hustě rozvět-
vuje ve vysoké, kuželovité koruny, jest záhy
a hojně plodný. V půdách není vybíravý, roste
a prospívá všude tam, kde jiné odrůdy; za
příliš nepříznivých poměrů strom podléhá kle-
jotoku.

Kvete pozdě. Jest cizosprašná.


Upotřebení: Dopravu snáší dobře; řadí se
mezi nejlepší tržní, výnosné odrůdy a zaslu-
huje pěstitelské pozornosti.

V půdách vlhkých bývají plody v poloviční
velikosti shazovány.

Synonyma: Schneider's späte Knorpelkirsche,
Guigne de Schneider, Późna Schneidra (pol.).

Vaněk: Lidová pomologie, IV.

Tab. XLIII.



85. Schneiderova pozdní chrupka.