

## 95. Büttnerova pozdní červená chrupka.

**Původu** jest německého.

**Plod** jest veliký, až velmi veliký, asi 21 mm vysoký a 24 mm široký, 10 plodů váží 78—85 g.

**Tvar** má široce tupě srdčitý, zdánlivě protáhlý, ve skutečnosti jest vždy o něco širší než delší; nejšířší je uprostřed, u stopky tupý, k temeni zúžený. Jedna strana bývá široce a více stlačená, druhá zase vypouklá, zhranatělá; příčný průřez jeví se kruhem k jedné straně širším, mírně, někdy i značně zhranatělým. Po straně více smáčknuté se táhne čára, končící vyvstalo smáčknutou tečkou na plochem, mírně zakulaceném temeni v maličké prohlubince; čára často tečku přetíná a dosti daleko se za ni táhne.

**Stopka** jest silná, asi 4 cm dlouhá, tmavě zelená, slabě zardělá, sedí pevně v prostorné, pěkně kroužené jamce.

**Slupka** jest pevná, leskne se, základní barvu má jasně žlutou, z větší části i v zastíněných místech je jasně červeně zastřená; v plné zralosti jest hnědě červená, červeně čárkovaná a mramorovaná, pestrá.

**Dužnina** tuhá, žlutá, jest jemně, bledě červeně řídce vláknitá, není příliš šťavnatá, jest znamenité, sladké a příjemně aromatické chuti.

**Pecka** jest oválně vejčitá, dosti baňatá, od dužniny úplně nepouští.

**Zraje** v V. třeseňovém týdnu.

**Strom** roste zdravě, dobře se rozvětňuje v široce kuželovitou korunu, plodí záhy, za příznivých poměrů hojně a pravidelně, na stanoviště není nikterak náročný.

**Kvete** prostředně záhy.


**Upotřebení:** Dopravu snáší dobře, jako znamenitá pozdní třeseň nachází vždy odbyt; jest výhodná pro konzervaci a vhodná ke všem účelům a proto se stává významnou tržní odrádu.

**Špatné vlastnosti:** Plody za vlhka praskají, ale ne více, než u jiných chrupek.

**Synonyma:** Büttner's späte rote Knorpelkirsche, Büttner's Harte Marmor, Büttner's Neue Rote Knorpel, Bigarreau Rouge Büttner.

Vaněk: Lidová pomologie, IV.

Tab. XLVIII.



Büttnerova pozdní chrupka.